

## Inleiding

Onder prikaccident worden ook snij-, spat of bijtaccidenten verstaan.

Na een prikaccident is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Dit protocol beschrijft welke stappen te nemen zijn voor zowel de huisartsenpraktijk in de rol van werkgever als voor de verwonde/bron.

Bij een prikaccident kan er een risico tot besmetting zijn in geval van een gebeurtenis waarbij iemand op zodanige wijze in contact komt met bloed, dat hij of zij het risico loopt besmet te raken met Hepatitis B, Hepatitis C en/of HIV. Bij een dergelijk accident wordt de huid door een voorwerp waaraan bloed kleeft, zoals een injectienaald, beschadigd. Hierbij kan 'bloed-op-bloed'- contact zijn ontstaan.

## Doelgroep

Dit protocol geldt voor alle medewerkers<sup>1</sup> van de 25 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Syntein en die in aanraking kunnen komen met scherpe hulpmiddelen, ook bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel, tijdelijke krachten, leerlingen en stagiaires.



<sup>1</sup> Accidenten van derden werkzaam voor of namens uw organisatie: Conform de Arbo wetgeving is de ondersteuning door PrikPunt standaard van toepassing op stagiaires, leerlingen, vrijwilligers, ZZP'ers, uitzendkrachten, personeel van (onder)aannemers (iedereen legitiem werkzaam voor de organisatie).

| Stap | Wie                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Huisartsenpraktijk<br>Medewerker/<br>verwonde | <b>Directe actie na Prikaccident: spoelen en desinfectie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wond laten doorbloeden, goed reinigen en daarna desinfecteren met alcohol 70% + chloorhexidine 0,5% of jodiumtinctuur 1%</li> <li>- Bij besmetting ogen: ruim spoelen met water</li> <li>- Noteer ANW gegevens van de bron (patiënt)</li> </ul> |
| 2    | Huisartsenpraktijk<br>Medewerker/<br>verwonde | <b>Melding prikaccident en triage</b><br>Neem contact op met Prikpunt via: <b>088-7745463</b><br><b>Benoem aan de centralist dat je onder Syntein valt.</b>                                                                                                                                                                                           |
| 3    | Huisartsenpraktijk                            | <b>Registratie incidenten</b><br>Werkgever (huisarts) houdt een lijst bij van de gemelde incidenten welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en registreert aard en datum van het incident.<br><br>Bron: <a href="#">Artikel 9 Arbeidsomstandighedenwet</a>                                                                    |

## Een werkgever kan verschillende maatregelen nemen om prikaccidenten te voorkomen (zie RI&E via SSFH)

- Beschikbaar stellen van veilige naaldsystemen.
- Aanbieden van informatie en training over juist naaldgebruik (niet recappen), bijvoorbeeld met instructiefilmpjes van de leverancier.
- Verzorgen van intern toezicht op toepassing van de maatregelen.
- Beperken van het aantal werknemers dat tijdens het werk met naaldsystemen in aanraking komt.
- Beschikbaar stellen van veiligheidsbrillen en handschoenen om spatincidenten te voorkómen.
- De grootst mogelijke orde en netheid op de werkplaats realiseren.
- Beschikbaar stellen van voldoende naaldcontainers om te voorkómen dat medewerkers met naalden moeten lopen.
- Een noodplan opstellen zoals voorgeschreven in het Arbobesluit en dit schriftelijk beschikbaar stellen op de werkplek.
- Faciliteren dat een deskundige, zoals een bedrijfsarts, binnen twee uur na een prikaccident een professionele risico inschatting kan uitvoeren en indien nodig de medewerker een behandeling kan laten ondergaan.
- Opnemen van het risico van prikaccidenten in de risico-inventarisatie en –evaluatie.
- Aanbieden van een hepatitis B-vaccinatie aan al het personeel dat enig risico loopt op een prikaccident.

Meer informatie: [Prikaccidenten | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#).